SUNSTAR

医療機関向け

歯周病菌とたたかう

G·U·M

歯周病治療を円滑に進めるために

セルフケアをどう管理するか



第3類医薬品　歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬

メディカルペーストC

Medical Paste C



患者さんのセルフケアに

歯周病*の治療、および予後管理においては、専門家の定期的な管理に加えて、自宅でのセルフケアが重要です。メディカルペーストCは、そうしたセルフケアのための歯周病（歯肉炎・歯周炎）薬です。

*歯周病：歯肉炎・歯周炎の総称です。

歯周病の治療・予後管理に

専門家の定期的な管理 ＋ **自宅で行うセルフケア**

このような患者さんに

- 歯周病の初期治療中で、出血・発赤腫れ・痛みがある
- 歯周病安定期治療（SPT）中で、プロービング時などに出血が認められる
- 口内炎がある

「抗炎症作用+殺菌作用+組織修復作用」により歯周病の諸症状を緩和

3種類の有効成分を配合。歯肉の出血・はれ・痛みなど歯周病の諸症状を緩和します。

- **グリチルリチン酸二カリウム 0.4%**
  歯肉の腫れや炎症を抑制
- **セチルピリジニウム塩化物水和物 0.3%**
  歯周病の原因菌を殺菌
- **パンテノール 0.4%**
  炎症により損傷した組織の修復を促進

1 歯肉の腫れや炎症を抑制

抗炎症剤GK2※1で、辛い腫れや出血の原因となる炎症を抑制!

甘草

甘草（カンゾウ）の根から抽出される成分で、強い抗炎症作用を持つGK2を、サンスター内最高レベル※2で配合。
炎症物質の発生を抑え、歯周病による歯肉の炎症を効果的に抑えます。

※1：グリチルリチン酸ニカリウム
※2：サンスター内0.4%配合

炎症のもとになる炎症物質を放っておくと、歯肉の腫れ・出血を引き起こします。

高濃度GK2が効果的に働き、炎症物質の発生を抑えます。

2 歯周病菌を効果的に殺菌

殺菌剤CPC※3が、歯周病菌を効果的に殺菌!

サンスター内最高レベル※4で、殺菌剤CPCも配合しています。

CPCは、歯と歯肉に滞留し、歯周病菌の付着を防ぐ力も!

歯と歯肉の表面は、マイナスに帯電しており、プラスに帯電しているCPCは、歯と歯肉の表面に滞留して、歯周病菌の増殖を抑えたり、菌が付着するのを防いだりします。





ヒト唾液由来菌液に製剤を60秒間接触させ、培養した後、菌量を測定
※5：γ-シクロデキストリン　出典：サンスター社内資料

※3：セチルピリジニウム塩化物水和物　※4：サンスター内0.3%配合

CPCを阻害する成分をγ-シクロデキストリンが包み込みCPCが自由になる
⇒殺菌力を最大限に引き出せる

3 歯肉を活性化させ組織を修復

パンテノールが、歯肉や口腔粘膜の組織修復に働く!

組織修復作用を持つパンテノールを配合。歯肉や口腔粘膜の細胞増殖を促進し、歯肉や口腔粘膜の修復を助けます。



ヒト歯肉繊維芽細胞に試験液を添加し、7日間培養後の細胞数を測定した。
出典：サンスター社内資料



ハムスター頬粘膜の創傷（口内炎）に試験液を1日2回塗布し、創傷面積を測定

$$\text{創傷面積縮小率}(\%) = \frac{\text{創傷作成時の創傷面積}(mm^2) - \text{各測定時点での創傷面積}(mm^2)}{\text{創傷作成時の創傷面積}(mm^2)} \times 100$$

出典：サンスター社内資料（試験委託先：公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター）

第3類医薬品　歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬

メディカルペーストC

使用方法

歯周病には1日2回(朝・晩)、歯みがき後にご使用ください。塗った後、食事をするときは、30分ほどおくことをおすすめします。

指で　適量(約0.3g)を指にとり、歯肉をマッサージするように塗り込んでください。

清潔にした指に適量(約0.3g)をのせます。

口を開き、患部に直接あてます。

患部にやさしく塗りこんでください。

ハブラシで　指が届きにくい部位は、ハブラシにつけてみがいてください。

いつものハブラシに適量(約0.3g)をつけます。

口を開き、患部にあてます。

歯肉をマッサージするように磨いてください。洗い流す必要はありません。

製品情報

【効能・効果】
歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯肉の出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

【用法・用量】
歯周病(歯肉炎・歯周炎):1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指又はハブラシにつけて歯肉をマッサージするように磨く。
口内炎:1日2〜4回、適量を患部に塗る。
〈用法・用量に関連する注意〉
(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(2) 歯科用にのみ使用すること。

【成分・分量】(1g中)

成分	含量	作用
グリチルリチン酸ニカリウム	4mg	歯肉や口内の炎症をしずめる(抗炎症作用)
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg	歯周病の原因となる細菌の増殖を抑える(殺菌作用)
パンテノール	4mg	歯肉や口腔粘膜の新陳代謝を促進し、正常な組織へ回復させる(組織修復作用)

添加物として、グリセリン、プロピレングリコール、セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、γ-シクロデキストリン、酸化チタン、サッカリンNa、リン酸水素Na、ハッカ油、香料、ℓ-メントール、ウイキョウ油、エタノールを含む。

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)

使用上の注意

■【相談すること】
1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
   (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

商　品　名	メディカルペーストC
容　　量	25g
販 売 単 位	1パック:10個
販 売 価 格	1パック¥10,790(税抜価格)
患者様希望価格	1個¥1,300(税抜価格)

医薬品についてのお問い合わせ
医薬品インフォメーションセンター
TEL 072-682-4815
受付時間/月〜金9:00〜17:00
(土・日・祝日は休業いたします)

サンスター株式会社　〒569-1195　大阪府高槻市朝日町3番1号

有限会社 マルヤマ歯科商店

2018年10月作成